

Zahnärztlich verordnete und angewandte Wirkstoffe in Schwangerschaft und Stillzeit

				1 - 13 W	14- 27 W	28- 39 W	Kommentar	Stillzeit	Kommentar		
				1. Trimenon	2. Trimenon	3. Trimenon					
Analgetika	Nicht-Opioide	Salicylsäurederivate	ASS	lowdose unproblematisch?			lowdose unprobl.		ASS		
				NSAP = NSAR = NSAID = NSA	Saure antipyretisch - antiphlogistische Analgetika	Ibuprofen					Ibuprofen
						Diclofenac				nicht langfristig geben	Diclofenac
						Dexketoprofen				Fachinformation	Dexketoprofen
						Naproxen				keine Information	Naproxen
		Coxibe	Etoricoxib				mangelde Erfahrung	Einzelosis möglich	Etoricoxib		
			Paracetamol				cave Lebertoxizität > 4g/D		Paracetamol		
		Nichtsaure antipyretische Analgetika	Metamizol					Einzelosis möglich	Metamizol		
			ohne antipyretisch-antiphlogistische Wirkung		Flupirtin			Fachinformation		Flupirtin	
			(schwache) Opioide		Codein				kurzzeitig möglich	Codein	
				Tilidin				keine Erfahrungen	Tilidin		
				Tramadol				bei entspr. Indikation	kurzzeitig möglich	Tramadol	

Mittel der ersten Wahl
 Mittel der zweiten Wahl (nur wenn erste Wahl nicht möglich)
 nur wenn unbedingt erforderlich, sonst zu vermeiden
 zu vermeiden / kontraindiziert
 PAL = Anwendung bei Penicillin-Allergikern

vorwiegend gegen aerobe Erreger wirksam
 vorwiegend gegen anaerobe Erreger wirksam
 gegen aerobe und anaerobe Erreger wirksam
 gegen aerobe und nur schwach gegen anaerobe Erreger wirksam

	Wirkungstyp	grampositiv	gramnegativ	PAL	aerob/anaerob	Name	1 - 13 W	14- 27 W	28- 39 W	Kommentar	Stillzeit
							1. Trimenon	2. Trimenon	3. Trimenon		
Antibiotika	bakterizid	[hatched]	[hatched]	[red]	[red]	Amoxicillin (&C)					
						Cefaclor (I)					
						Cefuroxim (II)					
						Cefixim (III)					wg.verm. Gram+Spektrum
	vorwiegend bakterizid	[hatched]	[hatched]	[green]	[green]	Ciprofloxacin					
						Moxifloxacin					
	vorwiegend bakteristatisch	[hatched]	[hatched]	[green]	[green]	Metronidazol					
						Doxycyclin					
						Demeclocyclin*					Fachinformation
						Erythromycin					Infectomycin® nicht 2/3. Tr.**
					Azithromycin						
					Clindamycin						

1-3% der Penicillin-Allergiker reagieren auf Cephalosporine der 3. Generation

*in D nur in Ledermix®, nur in Kombination mit Triamcinolon

**Infectomycin® ist Erythromycinestolat, das hepatotoxisch wirken kann.

		1 - 13 W	14- 27 W	28- 39 W	Kommentar	Stillzeit
		1. Trimenon	2. Trimenon	3. Trimenon		
Lokal Anästhetika	Articain				auch mit Adrenalin	
	Lidocain				auch mit Adrenalin	
	Mepivacain					
	Bupivacain				indikationsgerecht!	

Die Einschätzungen zum Gebrauch der Wirkstoffe in der Schwangerschaft beruhen auf der Interpretation von Bewertungen durch embryotox (www.embryotox.de) sowie, falls keine Bewertungen bei Embryotox vorliegen, auf den Fachinformationen der Hersteller. Alle Bewertungen beruhen auf indikationsgerechter Anwendung und Dosierung, auch wenn dies nicht explizit angegeben ist.

Die farblich kodierte Kurzbewertung kann keinesfalls die ausführlichen und differenzierten Bewertungen auf www.embryotox.de ersetzen.

Embryotox ist eine Website, die betrieben wird von der Charité Berlin (Pharmakovigilanz- und Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie) und der Beuth Hochschule für Technik, Berlin (technische Umsetzung) und wird unterstützt vom Bundesministerium für Gesundheit sowie der AOK.

Die vorliegenden Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben kann dennoch keine Haftung übernommen werden.

Im Zweifelsfalle sollten die Originaltexte auf www.embryotox.de sowie die Fachinformationen der Hersteller (z.B. auf www.pharmnet-bund.de) zu Rate gezogen werden.

Copyright MIZdental GmbH 2017 Ulrich Pauls Stand 6/2017